

La dosificación mixta está autorizada para los refuerzos de la vacuna contra el COVID-19.



Serie inicial	Pfizer	Moderna	Johnson & Johnson
Quando	6 meses o más después de completar la primer dosis.	6 meses o más después de completar la primer dosis.	2 meses o más después de completar la única dosis.
Quien	Personas mayores de 65 y 18 años con alto riesgo de COVID grave. Mayores de 18 que vive o trabaja en entornos de alto riesgo.	Personas mayores de 65 y 18 años con alto riesgo de COVID grave. Mayores de 18 que vive o trabaja en entornos de alto riesgo.	Cualquiera que haya recibido una primera dosis (18 o mayor)
Opciones de refuerzo	Pfizer, 1/2 dose Moderna, or Johnson & Johnson	Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson	Pfizer, media dosis de Moderna o Johnson & Johnson

Tercera dosis

- * Las personas con un sistema inmunológico moderado o grave son más vulnerables al COVID-19. Es posible que no desarrollen el mismo nivel de inmunidad con la serie de vacunas de 2 dosis, en comparación con las personas que no están inmunodeprimidas. [in.gov/isdh](https://www.in.gov/isdh)
- * Los CDC recomiendan que las personas con sistemas inmunitarios de moderado a gravemente comprometidos reciban una dosis adicional de la misma vacuna de ARNm COVID-19 al menos 28 días después de una segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 o la vacuna Moderna COVID-19.
- * Esta dosis adicional ayuda a mejorar los resultados de su primer dosis de vacuna, especialmente las personas inmunodeprimidas.
- * La recomendación actual es que las personas inmunodeprimidas reciban una dosis adicional 28 días después de completar una serie de vacunas de ARNm COVID-19.